

Mit barn har slået tænderne - mælketænder!

Hvis dit barn har slået munden eller mælketænderne




Når småbørn slår munden eller tænderne, bløder det ofte meget. Det ser tit meget værre ud, end det er.

Læbebåndet under overlæben får ofte en revne eller bliver revet over. Det bløder meget, men heler meget hurtigt uden behandling. Næsten alle får skadet deres læbebånd, når de er småbørn.

Læberne fungerer hyppigt som stødpude og tager meget af slaget.

Hvis dit barn har slået mælketænderne

Barnet bør have hurtig hjælp, hvis:

-  mælketænderne er slået meget løse
-  mælketænderne er slået skæve og ikke sidder rigtigt
-  barnet føler, det bider forkert sammen, eller ikke kan bide sammen

Det første, du skal gøre ved dit barn, er:

Prøv at berolige dit barn. Vask barnets mund forsigtigt med lunken vand og tør blodet væk.

Se efter både i overmund og undermund, om der mangler tænder, eller der er slået stykker af tænderne.

Du må ikke sætte en mælketand på plads, hvis den er slået helt ud.

Du kan risikere at beskadige den nye tand, der sidder oppe i kæben.

Hvis du er i tvivl, ring til din tandpleje og spørg dem til råds. Nummeret finder du på din tandplejes side her på hjemmesiden.

Hvis det er uden for åbningstid, så klik på "Nødhjælp" oppe i højre hjørne på din tandplejes side. Der står, hvor du skal henvende dig, eller hvor du kan ringe til.

Husk! Meget få mælketandsskader giver alvorlige skader på de nye tænder.

Der findes en særlig vejledning for skader på blivende tænder.



Let blødning omkring løse fortænder



Her ser vi et overrevet læbebånd. Det heler af sig selv.