

Information om præmedicinering af dit barn

Hvad er præmedicinering?

For at undgå, at dit barn føler ængstelse og uro under behandlingen, vil vi give dit barn beroligende medicin før behandlingen.

Hvordan gives medicinen?

Som en opløsning, dit barn skal drikke

Hvordan virker medicinen?

Barnet slapper af og bliver mindre ængsteligt. Midlet virker afslappende på muskulaturen og kan undertiden give en let svimmelhed. På trods af medicineringen kan enkelte børn blive både vrede og kede af det under eller efter behandlingen. Ofte glemmer barnet helt selve behandlingen.

Det er derfor vigtigt, at:

- en voksen sidder ved siden af barnet på hjemturen, også selvom barnet sidder fastspændt i autostol eller i sikkerhedssele.
- en voksen holder øje med barnet resten af dagen, også selv om barnet sover.
- barnet, hvis det sover efter behandlingen, ligger på siden, da lidt opkast kan forekomme



Venligst udlånt af ZIMPL Aps

NB ! Dit barn husker, hvad du fortæller om hændelsesforløbet. Fortæl, hvor dygtigt han eller hun har været, og hvor godt behandlingen gik.

Med venlig hilsen

Denne vejledning er udarbejdet af danske tandlæger for denkommunaletandpleje.dk.

Vejledningen bør kun anvendes som supplement til og erstatter på ingen måde egentlig mundtlig, tandlæge- eller lægefaglig rådgivning. Det tilrådes altid ved mindste tvivl at søge relevant vejledning hos egen tandpleje/tandlæge eller læge. denkommunaletandpleje.dk kan på ingen måde drages til ansvar, hverken direkte eller indirekte, for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt eller forudsat i denne vejledning.